ПОСТАБОРТНЫЙ СИНДРОМ

В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТУ

postabort.ru

ПАС. ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование 173 279 калифорнийских женщин с низким доходом изучало причины их смерти. При этом сравнивались женщины, которые родили, с теми, кто прервал беременность. По сравнению с женщинами, которые рожали, женщины, которые прервали беременность, более расположены к самоубийству (154%), к смерти от несчастных случаев (82%), к смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (187%) или от инсульта (446%), чаще умирают от СПИДа (118%) и от других причин (44%).

Источник: Риардон Д. и др. Результаты беременности, связанные со смертями: статистическая связь. Исследование женщин с низким доходом. Южный медицинский журнал, 2002. № 95 (8). — С. 834–841.

* * *

В обширном финском исследовании установлено, что женщины, которые прервали беременность, в шесть раз чаще умирали от самоубийства по сравнению с родившими женщинами и в 3,5 раза чаще по сравнению с небеременными женщинами.

Источник: Гислер М. Суициды после беременности в Финляндии, 1987–94: исследование регистрации связей. Британский медицинский журнал. Декабрь 1996. Vol. 313. — С. 1431–1434; Gisler et. al. Acta Obsetricia ET Gynecolgica Scandinavia 1997. Vol. 76. — P. 651–657.

* * *

В «Британском журнале психиатрии» (The British Journal of Psychiatry) опубликованы результаты исследований о психологических последствиях абортов. Исследования показали, что женщины, выносившие незапланированную беременность, значительно реже имеют проблемы с психическим здоровьем, чем аналогичные женщины, которые сделали аборт при незапланированной беременности. Женщины с абортом в анамнезе имели на 55% больше проблем в области психического здоровья, в отличие от женщин, которые решили не прерывать незапланированную беременность.

Источник: [Электронный ресурс]. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/abortion-and-mental-health-quantitative-synthesis-and-analysis-of-research-published-19952009/E8D556AAE1C1D2F0-F8B060B28BEE6C3D (дата обращения: 12.10.2018).

* * *

В октябре 2006 года пятнадцать ведущих акушеров и психиатров Великобритании написали открытое письмо в London Times, признавая и подтверждая психологические последствия абортов.

Источник: British Psychologists: Abortions Cause Women Mental Health Problems [Электронный ресурс]. URL: https://www.lifenews.com/2006/10/27/nat-2697/ (дата обращения: 12.10.2018).

8 (800) 100-30-70 (бесплатно, анонимно, профессионально)

АНБО «СПАСИ ЖИЗНЬ» www.sos-life.ru soslife@yandex.ru

В 1981 году психотерапевт, доктор философии, член Американской психологической ассоциации, содиректор Института постабортных исследований в Джексонвилле Винсент Ру (США) впервые дал определение постабортного синдрома (ПАС) как разновидности посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

ПАС — это совокупность симптомов, появляющихся у женщины после аборта.

Основные симптомы ПАС:

- чувство пустоты и утраты
- чувство вины и депрессия
- «флешбэки» и «переживания»
- ночные кошмары
- эмоциональная отгороженность
- саморазрушающее поведение
- нарушение взаимоотношений с людьми

НЕДАВНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

10% психических заболеваний у женщин связаны с абортами

Метаанализ выборки
из **877 181** женщины,
163 831 из которых совершили аборт,
выявил, что аборт
на **81%** повышает риск психических заболеваний,
в частности:

- суицидального поведения на **155%**
- тревожного расстройства на **34%**
- депрессии на **37%**
- употребления / злоупотребления алкоголем на **110%**
- употребления / злоупотребления марихуаной на **220%**

Источник: Коулман П. Аборт и психическое здоровье: количественный синтез и анализ исследований, опубликованных в 1995–2009 годах. Британский журнал психиатрии. 2011. № 199. — С. 180–186.

* * *

3 310 женщин в США были обследованы по критериям психических расстройств DSM-IV. Выявлено, что 5,8% суицидальных мыслей и 24,7% случаев употребления наркотиков могут быть связаны с абортом.

Женщины, которые прервали беременность, в 3,8 раза чаще злоупотребляют наркотиками, более склонны к тревожным расстройствам и суицидальным мыслям или действиям.

Источник: Мота и др. Связи между абортом, психическими расстройствами и суицидальным поведением в национальном масштабе. Канадский журнал психиатрии. 2010. № 55 (4). — С. 239–247.

АВСТРАЛИЙСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Представлено на Всемирной конференции психиатрической ассоциации. Мельбурн, ноябрь 2007 г.

Наблюдая за 1 112 молодыми женщинами от рождения до 21 года, исследователь Кэлин Дингл из Квинслендского университета выявила четкую связь между саморазрушающим поведением и совершенным абортом. Те, кто сделал аборт:

- в 3,6 раза чаще злоупотребляли тяжелыми наркотиками
- в 2 раза чаще становились алкоголиками
- почти в два раза чаще страдают от депрессии

Источник: Дингл и др. Прерывание беременности и психические расстройства у молодых женщин: исследование австралийской популяции. Британский журнал психиатрии. 2008. № 193. — С. 452–454.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ

Статистическое исследование более 1,1 млн беременностей, охватывающее всех финских женщин детородного возраста в период с 1987 по 2000 год. Было выявлено, что женщины, сделавшие аборт, в 6 раз чаще совершали самоубийство, по сравнению с женщинами, которые родили.

Частота смерти в результате ДТП или преднамеренного убийства была выше в четыре и десять раз соответственно среди тех, кто сделал аборт.

Среди молодых женщин (до 25 лет) частота самоубийств, связанных с абортом, была в двенадцать раз выше по сравнению с теми, кто родил, и в четыре раза выше по сравнению с небеременными сверстницами.

Источник: Гисслер М. и др. Травмы, смерти, самоубийства и убийства, связанные с беременностью. Финляндия, 1987–2000. Европейский журнал общественного здравоохранения. 2005. Т. 15 (5). — С. 459–463.

«СПАСИ ЖИЗНЬ» Автономная некоммерческая благотворительная организация помощи беременным и нуждающимся семьям с детьми