

Многие женщины после приема первой таблетки для медикаментозного аборта сожалеют о сделанном и хотят спасти своего ребенка.

По разным оценкам, в России проводится от 300 тысяч до 3 миллионов медикаментозных абортов в год. Препараты для медикаментозного аборта очень доступны.

Чтобы прекратить действие абортивной таблетки (мифепристон, пенкрафтон, мипристон и др.), нужно принять как можно быстрее его естественный антидот (противоядие) — ПРОГЕСТЕРОН.

Методика остановки медикаментозного аборта в России применяется с 2014 года.

Многим женщинам удалось сохранить жизнь малышей и стать счастливыми мамами благодаря применению прогестерона.

Более 300 женщин опробовали эту методику. Около 40% беременностей удалось сохранить.

N.B.

Прогестерон – естественный гормон, сопровождающий развитие ребенка во время беременности!

> Внутримышечное введение прогестерона и высокие дозы при его оральном применении показали наибольшую эффективность с показателями отмены в 64 и 68% соответственно. Явного роста рисков развития врожденных пороков не наблюдалось. Остановка действия мифепристона при применении прогестерона является БЕЗОПАСНОЙ и ЭФФЕКТИВНОЙ!

The Successful Reversal of the Effects of Mifepristone Using Progesterone, опубликован в журнале Issues in Law & Medicine, Volume 33, Number 1, 2018

> Случаи внезапного раскаяния, сразу после приема мифепристона, нередки. Если до этого женщина находится под воздействием обманчивой рекламы, рассказывающей про безвредность препарата и простоту «решения проблем», то в тот момент, когда ребенок начинает медленно умирать под воздействием яда, мать ощущает беспокойство, и к ней приходит осознание того, что на самом деле произошло.

Джордж ДЕЛЬГАДО, автор методики остановки медикаментозного аборта — доктор медицинских наук, США

КАК ОСТАНОВИТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ?

Для совершения медикаментозного аборта женщине назначают два препарата с промежутком времени приема в 36–48 часов.

Первый препарат, мифепристон, действует на плаценту, ухудшая питание внутриутробного ребенка.

Второй — мизопростол — способствует изгнанию, выкидышу плода.

Мифепристон является антагонистом прогестерона. Введение соответствующей дозы прогестерона по определенной схеме может остановить действие мифепристона.

Суть метода — прием 400–800 мг прогестерона (препараты «Утрожестан» и «Дюфастон»).

Успех метода зависит от ВРЕМЕНИ!!! Не забудьте о промывании желудка, если после приема препарата прошло не более 2 часов.

Согласно проведенному исследованию, с помощью приема прогестерона удается остановить 48–68% медикаментозных абортов.

Данные Отделения семьи и профилактической медицины (Университет Калифорнии, Сан-Диего, США) показали, что в четырех из шести случаев удалось добиться блокировки мифепристона, остановить искусственный выкидыш и спасти ребенка с помощью инъекции 200 мг прогестерона.

Препарат прогестерон в течение десятилетий успешно применяется в гинекологии. Его назначают женщинам в случае угрозы выкидыша!

Подробнее о методике здесь:
https://peredumala.ru/progesteron-injection/

И здесь:
https://peredumala.ru/utrojestan/

АНО ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ И НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ «СПАСИ ЖИЗНЬ» * СПАСИ ЖИЗНЬ 8 800 100 30 70 sos-life.ru

Выпила таблетку и передумала?

Звони! Поможем! +7 (928) 418-42-75 WhatsApp, Viber бесплатно, 24/7

КАК ОСТАНОВИТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ?

peredumala.ru https://m.vk.com/peredumala_ru

Не покупайте таблетки для медикаментозного аборта «с рук», в Интернете и в других местах. Это ОПАСНО! Кто-то зарабатывает на вашем доверии и здоровье!

ВИКТОРИЯ — ЗНАЧИТ ПОБЕДА!

Мы приехали в отпуск 10 июня 2019 года с двумя детьми 3 и 5 лет. Узнала, что в положении. Вся семья ополчилась против, жалея меня, так как дети малые и мы только вылезли из горшков. Семейный совет отправил меня на аборт. Выпив мифепристон в частной клинике, я всю ночь плакала и переживала. Помогли мне остановить аборт в группе https://m.vk.com/peredumala_ru.

Сделав УЗИ на следующий день в независимой клинике, я узнала, что ребенок живой. Пошла в церковь, где горько плакала. Батюшка сам отвез меня на сохранение. Отлежав неделю, я сохранила жизнь малышке. И вот сегодня, 16.02.2020, мы родились. Красавица и умница Виктория! 3 780 г и 51 см! Любуюсь ей. Спасибо Богу и вам!

48–68%

медикаментозных абортов

удается остановить с помощью приема прогестерона

«Как я выпила мифепристон и передумала».

Милые женщины, если вы оказались в сложной ситуации и приняли решение под давлением, на эмоциях, — еще есть шанс! Боритесь за своего малыша, не читайте страшилок о возможных патологиях: исследование доказало, что мифепристон не влияет на плод! Не верьте тем, кто скажет, что малыш погиб, не проверив этого на УЗИ. Верьте в свой шанс!

«СПАСИ ЖИЗНЬ»

Автономная некоммерческая благотворительная организация помощи беременным и нуждающимся семьям с детьми

Изображения: Freepik.com